

COLIQUES

FAITS: Les coliques demeurent la **cause no 1 de décès** chez les chevaux. Heureusement, bonne nouvelle, pas toutes les coliques sont mortelles; en prenant quelques précautions et en agissant vite on peut diminuer l'incidence et la gravité de celles-ci. En effet beaucoup de coliques vont se résoudre avec un traitement médical de base. Toutefois, **chaque cas de colique doit être pris au sérieux car il peut être difficile de faire la différence entre une colique légère et une colique sévère.**

❖ QUOI?


Ce n'est pas une maladie, simplement un symptôme.
COLIQUE = DOULEUR ABDOMINALE = dans le ventre

* LES SIGNES *

- regarder ses flancs
- gratter le sol
- se coucher de façon répétitive ou essayer de le faire
- se donner des coups de pattes au ventre ou se mordre le ventre
- se rouler souvent avec ou non des bruits d'inconfort
- perte d'appétit / pas d'appétit
- joue dans son eau
- diminution ou absence de fumier
- se met en position pour uriner mais ne fait rien
- sudation inappropriée ou excessive
- position de chien assis ou couché sur le dos
- posture tête étirée
- respiration rapide, narines dilatées
- absence de bruits digestifs (coller son oreille au flancs)
- dépression
- anxieux

Parfois le seul signe est que votre cheval ne semble pas dans son assiette. Vous êtes la personne qui connaît le mieux l'attitude normale de votre cheval. Fiez vous à votre jugement si vous pensez que votre cheval n'est pas bien.

Le plus souvent les coliques sont d'origine digestive (estomac, intestin) mais il y a aussi plusieurs autres conditions qui peuvent causer une douleur abdominale (.....)



On peut classer les coliques d'origine digestive en 3 groupes principaux:

<p>1. <u>Dysfonctions intestinales:</u></p> <p>La plus commune.</p> <p>Ce sont des désordres de la motilité intestinale, les intestins ne fonctionnent pas normalement (spasmes, gonflement gazeux, impaction, diminution de la motilité – iléus).</p> <p>Habituellement ces coliques répondent bien aux traitements médicaux simples.</p>	<p>2. <u>Accidents intestinaux:</u></p> <p>déplacement / torsion d'un segment d'intestin, portion d'intestin qui reste coincé entre 2 organes.</p> <p>Souvent ces chevaux ont une certaine prédisposition anatomique pour ces déplacements.</p> <p>Ces accidents requièrent presque toujours une chirurgie d'urgence.</p>	<p>3. <u>Inflammation ou ulcères:</u></p> <p>stress, médicaments, infection, parasitisme...</p>
---	---	---

❖ EN ATTENDANT LE VETERINAIRE ...


IMMEDIATMENT:

1. **Enlever toute nourriture, laisser un peu d'eau** (toute ingestion de nourriture peut empirer un blocage)
2. **Marcher votre cheval**
(en général si votre cheval est debout ou couché calmement, il n'y a pas d'urgence à le marcher. Par contre si votre cheval est agité ou se roule/couche à répétition alors la marche est bénéfique pour le distraire et soulager la douleur). N'épuisez pas votre cheval, laissez lui se reposer entre les marches. Si il est trop dangereux laissez le dans son box!

PREPARER DES INFORMATIONS POUR LE VETERINAIRE:

- Température**
- Couleur des gencives** (rose-pâle-blanc-rouge brique-violacé-jaunâtre en ordre croissant de sévérité) indique si le cheval est en choc, déshydraté ou toxique.
- Pouls** (la fréquence cardiaque est un bon indicateur du niveau de douleur et la sévérité de la colique) >60 battement / min = sérieux
- quantité / apparence du fumier** (garder un tas pour le vétérinaire)
- dossier médical (vermifuges, antécédents...)
- Penser si il y a eu un changement de régime dernièrement (foin/grain/paturage, exercice, environnement...)

- Penser si référer votre cheval dans un hôpital vétérinaire est une option. Si oui, préparer le mode de transport. Les coliques difficiles ont un meilleur taux de survie lorsqu'elles sont référées TÔT. (colique médicale +/- 2000\$, chirurgicale +/- 5000\$)



EXAMEN PHYSIQUE – VALEURS DE REFERENCE

<i>Temperature</i>	37-38.5 C (99-101 F)	Poulain 37.5-39 C (99-101.5F)
<i>Pouls</i>	28-48 battements / min	Poulain 60-120
<i>Respirations</i>	10-20 / min	Poulain 30-40
<i>Gencives</i>	Roses et humides Reprend une couleur rose en moins de 2 sec lorsque comprimés	Roses et humides Reprend une couleur rose en moins de 2 sec lorsque comprimés
<i>Fumier</i>	10-12 tas par jour	
<i>Eau</i>	20-40 L cheval 1000lbs par jour	

NE PAS ...

- ... donner de médicament à votre cheval sans en parler à votre vétérinaire avant (certains anti-douleurs comme la banamine peuvent camoufler les signes d'une colique sérieuse)
- ... donner d'huile minerale avec un tube nasogastrique (si mal fait, l'huile peut se retrouver dans les poumons et causer une pneumonie fatale)
- ... attendre trop longtemps en pensant que ça va se passer...
- ... trop marcher votre cheval, il ne faut pas l'épuiser!
- ... faire d'examen rectal à votre cheval (vous risquez de causer une lacération rectale)

❖ REDUIRE LES FACTEURS DE RISQUE

- ✓ Maintenir une **régie alimentaire stable** et introduire les changements alimentaires graduellement.
- ✓ Nourrir votre cheval souvent (**foin de qualité à volonté**, grain par petits repas fréquents)
- ✓ **Ne pas donner trop de grain par rapport à son activité** (en théorie seuls les chevaux qui font une activité physique intense et les chevaux difficiles d'entretien devraient recevoir beaucoup de grain). Le grain ne devrait pas dépasser 40% de la ration. Le grain contient beaucoup d'amidon, difficile à digérer par les chevaux, et lorsque ça s'accumule dans les intestins, a le potentiel de créer des problèmes. Le système digestif du cheval est principalement adapté pour l'ingestion du foin et de l'herbe.
- ✓ Maintenir une **routine**.
- ✓ **Encourager la consommation d'eau** (accès illimitée à de l'eau propre tiède en hiver et fraîche l'été). Un cheval devrait boire 20-30 L d'eau par jour.
- ✓ Favoriser un **exercice régulier** aide la motilité digestive (sorties journalières si possible). Eviter un exercice intense suivi de longues périodes de repos (au box).
- ✓ Suivre un **protocole de vermifuge régulier**
- ✓ **Vérifier les dents** de votre cheval régulièrement
- ✓ **Réduire l'ingestion de sable** (éviter de nourrir le foin sur le sol surtout dans les régions sablonneuses)
- ✓ **Réduire le stress**. Administrer des médicaments anti-ulcères en prévention si votre cheval est à risque (compétitions, voyages...).
- ✓ Considérer l'ajout de **pré et probiotiques** à l'alimentation de votre cheval surtout s'il a des antécédents de colique.

SERVICES VETERINAIRES AMBULATOIRE EQUIN
EQUINE AMBULATORY VETERINARY SERVICES
Dre Alix Serapiglia

