



SOINS DU POULAIN

❖ 1ers 24 HEURES

- **Schédulez un examen vétérinaire du poulain dans les 1ers 24h** pour vérifier sa santé générale. Une détection précoce de tout signe anormal peut être la différence entre la vie et la mort de votre poulain. Le vétérinaire pourra également vérifier la prise du colostrum (1er lait très riche en anticorps) avec une petite prise de sang qui mesure le taux d'anticorps du poulain.

Poulain nouveau né – Pensez 1 2 3

Debout 1 heure post-poulinage	<input type="checkbox"/>	Température normale 37.5-38.5
Tête 2 heures post-poulinage	<input type="checkbox"/>	
Meconium 3 heures post-poulinage	<input type="checkbox"/>	

* Le meconium est le 1er fumier du poulain (noir goudron). Le poulain peut être constipé 12-24h

* Le poulain devrait têter plusieurs fois par heure (3-5 fois).

* **La prise du colostrum est très importante: le système immunitaire du poulain naissant est quasi nulle. Le poulain ne peut absorber le colostrum que les 1ers 24h et devrait avoir consommé la majorité endedans 6-8 heures.**

* Le poulain normal devrait être alerte, réagir à son environnement et chercher à têter rapidement.

* Soins de l'ombilic: vérifier qu'il n'y a pas d'écoulement d'urine, de saignement ou d'enflure.

Tremper le cordon avec une solution désinfectante 2 fois par jour pour 3-4 jours (teinture d'iode 5% ou chlorhexadine 0.5%) en évitant de toucher au ventre avec la solution.

Appeler le vétérinaire si

- Le poulain ne respire pas normalement
- Le poulain est faible, incapable de se lever ou de rester en position sternal, pas de reflexe de têtage (vérifier avec le doigt), pas de tonus musculaire, ne répond pas à la stimulation des naseaux avec de la paille
- Le poulain ne tète pas
- Température anormale
- La jument ne laisse pas têter son poulain

*** N'oubliez pas qu'un poulain nouveau-né peut se détériorer très rapidement. Un traitement tôt et agressif est la clé du succès en cas de problème!**





❖ 1eres SEMAINES

Les 4 premiers jours de naissance sont les plus critiques!

Observez votre poulain souvent les premières semaines pour détecter tout signe de problème le plus tôt possible.

Appelez le vétérinaire si

- La fréquence d'allaitement diminue ou cesse (souvent le 1er signe de maladie)
- Le poulain est amorphe, reste souvent couché, n'explore pas son environnement
- Diarrhée qui dure plus de 24h
- Toux, respiration difficile
- Fièvre (normale 37.5-38.5 C ou 99-101.5 F)
- Ombilic: écoulement d'urine ou de pus, chaleur, enflure, rougeur
- enflure, chaleur au niveau des articulations
- Déformation au niveau des membres

❖ 1ere ANNEE

Alimentation et croissance

Le poulain nouveau-né devrait consommer 15-25% de son poids en lait par jour et prendre 1-2 lbs par jour.

Un gain de poids excessif, des pics de croissance trop rapides ou une diète mal balancée en protéines, calcium, phosphore et autres minéraux, peut favoriser l'apparition de maladies osseuses de croissance (ex: OCD, wobbler...).

A partir d'environ 10-12 semaines d'âge le lait maternel ne suffit plus.

Le poulain devrait avoir accès à du foin à volonté qu'il commencera à grignoter vers 2-3 semaines d'âge. A partir de 8-12 semaines d'âge introduisez graduellement le grain, environ 0.5-1 lbs par 100 lbs de poids par jour ou 1 lbs par mois d'âge.





Soins vétérinaires

✓ VACCINS:

Le poulain reçoit sa protection initiale contre les maladies par les anticorps maternels du colostrum. Ces anticorps ne sont pas éternels et finissent par disparaître avec le temps. Le poulain a commencé à former son propre système immunitaire en étant soumis à son environnement mais ce n'est pas suffisant. Il devient alors important de continuer à protéger le poulain contre les principales maladies par la vaccination.

Cependant il ne faut pas non plus vacciner trop tôt, car ces mêmes anticorps maternels qui protègent le poulain, peuvent interférer avec la vaccination et empêcher le poulain de monter une réponse immunitaire adéquate suite aux vaccins.

	Rhinopneumonie	Influenza	Rage	Tétanos	West Nile EEE
Poulain mère vaccinée	6 mois ()	6 mois ()	6 mois ()	6 mois ()	4 mois ()
	7 mois ()	7 mois ()	7 mois ()	7 mois ()	5 mois ()
	12 mois ()	12 mois ()	12 mois ()	12 mois ()	12 mois ()
Poulain mère non vaccinée	6 mois ()	6 mois ()	4 mois ()	4 mois ()	4 mois ()
	7 mois ()	7 mois ()	5 mois ()	5 mois ()	5 mois ()
	12 mois ()	12 mois ()	12 mois ()	12 mois ()	12 mois ()

✓ VERMIFUGES:

Les poulains, ayant peu d'immunité, sont très vulnérables à une grosse infestation de parasites intestinaux (surtout les ascaris et les strongles).

Les poulains devraient être vermifugés 1 fois par mois jusqu'à l'âge de 1 an.

Attention! La vermifugation des poulains doit se faire en douceur car ils sont souvent parasités en grand nombre. On veut éviter la formation de bouchons parasitaires qui peuvent alors causer des coliques importantes.

Il faut éviter certaines classes de vermifuges comme le moxidectin (Quest), le praziquantel (Quest plus/Eqvalan gold) et le pyrantel (strongid).

Première dose avec du **fenbendazole simple dose**, 3 semaines plus tard **fenbendazole double dose** (par ex, poulain de 100 kg donner dose de 200 kg) une fois par mois pour 6 mois, puis **ivermectin ou fenbendazole simple dose** (en alternance) 1 fois par mois jusqu'à 1 an.

✓ MALADIES:

Les maladies les plus fréquentes durant la première année sont les problèmes respiratoires (influenza, herpesvirus, pneumonies bactériennes), les diarrhées, le parasitisme, les coliques.

Appelez le vétérinaire si

- Diarrhée qui dure plus de 24h avec fièvre
- Toux, respiration difficile, écoulement nasal jaune-vert
- Fièvre (normale 37.5-38.5 C ou 99-101.5 F)

