

CONTRE QUELLES MALADIES DOIS-JE VACCINER MON CHEVAL?



	SIGNES GENERAUX	SOURCES D'INFECTION	NOTES
Influenza Equin	Rarement fatal, toux, perte d'appétit, fièvre, dépression, douleur musculaire, écoulement nasal/oculaire	Très contagieux. Garder les animaux affectés isolés.	IMPORTANT chevaux en contact avec d'autres (pension, concours, voyage ...)
Rhinopneumonie	Détresse respiratoire, écoulement nasal, toux, fièvre. Cause des avortements chez les juments gestantes. Il existe aussi une forme neurologique plus rare, mais le vaccin ne protège pas contre celle-ci.	Très contagieux. Garder les animaux affectés isolés.	IMPORTANT chevaux en contact avec d'autres (pension, concours, voyage ...)
Tétanos	Difficulté à manger et/ou marcher, hyperréactivité au bruit, raideur, élévation de la 3e paupière, spasmes et paralysie musculaire.	Non contagieux. Causé par les ponctions et plaies infectées.	TRES IMPORTANT Le cheval est l'espèce la plus sensible.
Rage	Toujours fatal Fièvre, convulsions, hyperréactivité au bruit et toucher, incapacité à se tenir debout, excès de salive, changements de comportement, raideur.	Non contagieux. Transmis par morsure d'un animal affecté (raton-laveur, renard, mouffette, chauve-souris...)	IMPORTANT
Virus du Nil	Incoordination, fasciculations et tremblements musculaires, fièvre, hyperréactivité au bruit et toucher, incapacité à se tenir debout, convulsions-coma.	Non contagieux mais transmis par les moustiques	IMPORTANT
Encephalomyelites (Est/Ouest)	Souvent fatal, fièvre, trébuchements, tournis, dépression, fatigue	Non contagieux mais transmis par les moustiques	TRES IMPORTANT Maladie présente au Qc depuis 2008 (EEE)
Fièvre du Potomac	Léthargie, anorexie, fièvre, colique, fourbure, colite, diarrhée	Transmis durant la saison des insectes aquatiques (aout-octobre). Attention aux sources d'eau.	FACULTATIF Important si voyage aux EU ou Ontario et en émergence au Qc depuis été 2010. Présence accrue en Montérégie.


VACCINATION

	Rhinopneumonie	Influenza	Rage	Tétanos	West Nile EEE
Poulain mère vaccinée	6 mois () 7 mois () 12 mois ()	6 mois () 7 mois () 12 mois ()	6 mois () 12 mois ()	6 mois () 7 mois () 12 mois ()	4 mois () 5 mois ()
Poulain mère non vaccinée	6 mois () 7 mois () 12 mois ()	6 mois () 7 mois () 12 mois ()	4 mois () 12 mois ()	4 mois () 5 mois () 12 mois ()	4 mois () 5 mois ()
Cheval de compétition	Tous les 3-4 mois	Tous les 3-4 mois (intranasal tous les 6 mois)	annuel	annuel	annuel (printps)
Cheval de plaisance	annuel ou bi-annuel (printps/automne)	Annuel ou bi- annuel (printps/automne)	annuel	annuel	annuel (printps)
Jument gestante	EHV-1 inactivé 5-7-9 mois de gestation	Bi-annuel, rappel 1 mois avant poulinage	annuel avant repro	annuel, rappel 1 mois avant poulinage	annuel, rappel 1 mois avant poulinage